

Preencher quando não houver etiqueta

Nome:

Data Nasc:

Cód.:

Leito:

Conv.:

Médico:

## TERMO DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE SANGUE INTRAOPERATÓRIA

Como parte de seu tratamento, seu médico solicitou a realização do procedimento de recuperação de sangue intraoperatória. Trata-se de uma modalidade de transfusão de sangue autólogo, em que o sangue é recuperado do campo cirúrgico e processado utilizando equipamentos específicos para posterior reinfusão durante o ato operatório. Esta estratégia minimiza a necessidade de transfusão de sangue alogênico (sangue obtido através de uma doação de outra pessoa).

O procedimento é simples, realizado rotineiramente em cirurgias com elevado potencial de sangramento. A recuperação intraoperatória será executada por profissional habilitado, durante o ato cirúrgico e a infusão do sangue ocorrerá após solicitação do seu médico.

### A ser preenchido pelo paciente ou seu responsável:

A proposta de recuperação intraoperatória a que serei submetido (a), seus benefícios, riscos, complicações potenciais me foram explicadas pelo médico assistente. Li o informativo sobre Recuperação de Sangue Intraoperatória e tive a oportunidade de fazer perguntas, que foram respondidas satisfatoriamente. Entendo que não exista garantia absoluta sobre os resultados a serem obtidos.

Desta forma eu: ( ) Paciente ( ) Responsável

( ) ACEITO a realização da recuperação intraoperatória.

( ) NÃO ACEITO e declaro ter obtido os esclarecimentos necessários sobre os riscos desta decisão.

Nome legível: \_\_\_\_\_

Grau de parentesco: \_\_\_\_\_ Identidade N° \_\_\_\_\_

Salvador, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_:\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Responsável pela aplicação do Termo de Consentimento \_\_\_\_\_

### DEVE SER PREENCHIDO PELO MÉDICO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CLÍNICA

Autorizo a realização da recuperação intraoperatória – Urgência Clínica.

Paciente ou responsável encontra-se impossibilitado para submissão do Termo de Ciência e Consentimento.

Salvador, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ CRM: \_\_\_\_\_

Este consentimento é válido para o período de internação e se aplica aos pacientes cirúrgicos com prescrição médica de recuperação intraoperatória.

Nome:

Data Nasc:

Cód.:

Leito:

Conv.:

Médico:

## TERMO DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE SANGUE INTRAOPERATÓRIA

A recuperação de sangue autólogo intraoperatório é uma técnica utilizada na prática clínica que possibilita a recuperação, lavagem e reinfusão do sangue perdido pelo paciente no campo intraoperatório. Este procedimento é realizado através de um equipamento chamado Recuperadora de Sangue Intraoperatória ou o termo em inglês "Cell Saver".

O sangue extravasado no campo operatório é aspirado através de um sistema estéril, filtrado e transferido para um reservatório. Após a obtenção de um volume apropriado, o sangue é centrifugado e lavado com solução fisiológica, descartando o sobrenadante e transferindo o volume de hemácias lavadas para uma bolsa. Esta bolsa de sangue poderá ser transfundida imediatamente ou no momento necessário durante o período intraoperatório. Demais componentes do sangue, outros que não os glóbulos vermelhos, não são possíveis de serem recuperados neste procedimento.

A recuperação de sangue intraoperatória tem a grande vantagem de reduzir ou mesmo substituir a necessidade de transfusão intraoperatória de glóbulos vermelhos alogênicos (aquele que é obtido do doador de sangue), reduzindo o risco de reações transfusionais tais como: aloimunização, reações febris, reações hemolíticas ou mesmo transmissão de agentes infecciosos. Adicionalmente, esta técnica possibilita a imediata disponibilidade de sangue de tipo específico para o paciente, especialmente na vigência de hemorragias maciças.

A recuperação de sangue intraoperatória não é indicada em todas as cirurgias.

As **indicações principais** são:

- Cirurgias com previsão de consumo de pelo menos 1 unidade de glóbulos vermelhos.
- Emergências clínicas com perda de > 1500 ml de sangue.
- Cirurgias cardiovasculares com circuito de extracorpórea.
- Cirurgias vasculares e ortopédicas de grande porte.
- Transplante de órgãos.

A recuperação de sangue intraoperatória tem como principais **contraindicações**:

- Cirurgias que tenham contaminação bacteriana ou células neoplásicas no campo operatório.
- Uso de alguns fármacos, cimento cirúrgicos ou agentes hemostáticos no campo operatório.
- Presença no campo operatório de líquidos orgânicos tais como: líquido amniótico, urina ou gordura.
- Pacientes com Anemia Falciforme ou Hemoglobinopatias pelo risco de hemólise.

O sangue obtido da recuperação intraoperatória é de uso **EXCLUSIVO** do paciente e deverá ser infundido enquanto o paciente estiver na sala cirúrgica.