

Para que este medicamento é utilizado?

Indicado para a melhora e controle da falta de ar em pacientes com broncoconstrição ou broncoespasmo em pacientes que são portadores de asma brônquica e em pacientes portadores da doença pulmonar obstrutiva crônica (enfisema pulmonar e bronquite crônica).

Como este medicamento funciona?

O formoterol di-hidratado age no sintoma de falta de ar, pois determina uma broncodilatação das vias aéreas inferiores (brônquios).

A budesonida possui ação anti-inflamatória local e demonstra efeitos tanto antialérgico como anti-inflamatório, ambos os efeitos melhoram a obstrução dos brônquios tanto na fase precoce como na fase tardia da reação alérgica.



Serviço de Assistência Farmacêutica

Comitê de orientação e educação ao paciente, familiar ou acompanhante



REDE D'OR



rededor.com.br

 (21) 2101-2658

 3003-3230

Cuidados voltados à administração de
Inalatório Oral:
Formoterol +
Budesonida

REDE D'OR

Como devo tomar esse remédio?

Inaladores de pó seco em cápsula inalatória (inalador unidose)

Os inaladores possuem perfuradores que, ao serem perfurados, furam a cápsula e liberam o medicamento para ser inalado.

A inspiração forçada no bocal faz a cápsula perfurada girar em alta velocidade dentro do dispositivo e liberar seu conteúdo.

1 - Retire a tampa do inalador.

2 - Abra o frasco com as cápsulas do medicamento.

3 - Retire a cápsula sem o contato com as mãos, utilizando a tampa do frasco ou luva.

4 - Coloque a cápsula no compartimento interno, na base do inalador.

5 - Feche o frasco e feche o inalador. É importante que a cápsula somente seja retirada do frasco imediatamente antes do uso do inalador.

6 - Pressione completamente o botão frontal do inalador para a perfuração da cápsula. Em seguida solte o botão.

7 - Solte o ar dos pulmões o máximo possível.

8 - Coloque o bocal do inalador na boca e feche os lábios ao redor dele. Incline levemente a cabeça para baixo (aproximadamente 45°).

9 - Inspire de maneira rápida e o mais profundamente possível.

10 - Segure a respiração contando mentalmente até 10 (aproximadamente 10 segundos), enquanto isso retire o inalador da boca.

11 - Em seguida respire normalmente.

12 - Abra o inalador e verifique se ainda há resíduo de pó na cápsula. Caso ainda reste pó, repita os procedimentos.

13 - Após o uso, abra o inalador, remova e descarte a cápsula vazia. Feche o bocal e recoloque a tampa.

14 - Enxaguar a boca após o uso, mas não beba água.

Como faço para limpar o inalador?

Faça uso de escova ou pincel macio, removendo resíduos após cada uso.

Quais efeitos indesejados este medicamento pode provocar?

Dor de cabeça, tremor, candidíase na orofaringe, irritação ou inflamação de faringe e cavidade nasal e infecções do trato respiratório superior (do nariz a traqueia).

E se eu esquecer de tomar o medicamento?

Utilize assim que se lembrar. Se for quase o horário da sua próxima dose, não duplique a dose para compensar a dose esquecida.

Onde e como devo guardar e/ou desprezar o medicamento?

Utilize assim que se lembrar. Se for quase o horário da sua próxima dose, não duplique a dose para compensar a dose esquecida.

Mantenha o medicamento na embalagem original e em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). Proteja-o da umidade.

Nome do medicamento descrito na receita médica:

Lembre-se: A utilização de dispositivos inalatórios é uma habilidade que deve ser desenvolvida para que as medicações sejam administradas com eficácia.



Em caso de dúvidas sobre medicamentos, procure o farmacêutico.

