

Serviço de Assistência Farmacêutica

Comitê de orientação e educação ao
paciente, familiar ou acompanhante

REDE D'OR

rededor.com.br

 (21) 2101-2658

 3003-3230

**Orientação de
administração de
medicamentos via
Dispositivos Enterais**



REDE D'OR

Orientações gerais:

Todos os medicamentos prescritos pelo seu médico serão avaliados por um farmacêutico, a fim de garantir a compatibilidade com a via de administração;

Daremos preferência sempre que possível para medicamentos na forma farmacêutica líquida, para evitar a maceração de medicamentos sólidos;

Se houver a necessidade de partir, triturar ou dispersar conteúdo do comprimido ou cápsula, utilize um cortador ou recipiente apropriado para esse manuseio, um medicamento por vez, preferencialmente material em vidro ou porcelana que possa usar exclusivamente para essa finalidade, mantendo-o sempre seco e limpo com uso apenas de água e sabão.

Não macerar ou diluir todos os medicamentos juntos para administrá-los pela sonda.

Após administrar um remédio por sonda, lembre-se de lavá-la antes de administrar o próximo remédio.

Dispositivo:

SNE () / SNG () / SND () / SNJ ()

SOG () / GTT () / TQM ()

Volume recomendado para lavar a sonda: Recomendações especiais conforme manual hospitalar.

Atenção aos medicamentos que possuem sigla no nome, como XR, CR, XRO, DR, ER, BD. Consulte o farmacêutico para saber se podem ser administrados por sonda.

Caso o paciente receba dieta pela sonda de forma contínua, lembre-se de pausá-la sempre que for administrar um medicamento. É necessário lavar a sonda antes e após administrar o medicamento para, depois, reiniciar a dieta. Esta ação é importante para evitar a interação entre o medicamento e nutrientes da dieta.

Como preparar cada remédio?

Lembre-se sempre de higienizar as mãos antes da manipulação dos medicamentos.

Comprimido:

- Coloque o comprimido no recipiente destinado e o triture até formar um pó sem partículas maiores.
- Adicione 10 ml de água mineral e misture até que todo o pó esteja diluído.
- Aspire o conteúdo líquido preparado com uma seringa e administre pela sonda.

Cápsula:

- Abra a cápsula no recipiente destinado ou um copo e deixe que o conteúdo caia em seu interior. A parte dura da cápsula pode ser descartada;
- Não triture o conteúdo das cápsulas, essa ação pode comprometer o efeito do medicamento;
- Adicione 10 ml de água mineral e misture até que todo o pó esteja diluído;
- Aspire o conteúdo com uma seringa e o administre pela sonda.

Drágea:

- Coloque a drágea em um copo ou recipiente destinado, com 10 ml de água mineral;
- Espere que a drágea se dissolva por completo;
- Aspire o conteúdo com uma seringa e o administre pela sonda.

Suspensão:

- Agite bem a suspensão antes de usar;
- Com a ajuda de uma seringa, aspire o volume prescrito e o administre pela sonda.

Nome do medicamento descrito na receita médica:

Sempre consulte o médico antes de introduzir algum desses medicamentos.



Em caso de dúvidas sobre medicamentos, procure o farmacêutico.