

Para que este medicamento é utilizado?

Indicado para o tratamento regular da asma (doença obstrutiva reversível das vias respiratórias), tratamento de manutenção da DPOC, inclusive bronquite crônica e enfisema.

Como este medicamento funciona?

Quando é inalado nas doses recomendadas, o propionato de fluticasona apresenta potente ação anti-inflamatória pulmonar, que resulta na redução dos sintomas e da exacerbação da asma.

O salmeterol produz broncodilatação de duração mais longa (de pelo menos 12 horas).



Serviço de Assistência Farmacêutica

Comitê de orientação e educação ao paciente, familiar ou acompanhante



REDE D'OR





rededor.com.br

 (21) 2101-2658

 3003-3230

Cuidados voltados à administração de
Inalatório Oral:
Salmeterol +
Fluticasona

REDE D'OR



Como devo tomar esse remédio?

Inaladores de Pó seco ativados pela respiração (inalador multidose)

Os inaladores de pó seco liberam o medicamento quando você inala profundamente pelo bocal.

1 - As doses ficam disponíveis para administração após o movimento de uma alavanca ou giro até que um sinal sonoro (ex.: clique) indica que a dose está pronta para ser inalada por meio de inspiração forçada. Toda vez que essa alavanca for pressionada, uma nova dose será liberada para aspiração e o marcador indicará uma dose a menos. Não deve ser empurrada a alavanca mais de uma vez para não desperdiçar outras doses. A dose pode ser perdida ou derramada se o inalador for tombado após o carregamento.

2 - Expire profundamente (sobre) mantendo o inalador afastado da boca.

3 - Coloque o bocal entre os lábios. Inspire rápida e continuamente pela boca, o mais profundamente possível. Não inspire pelo nariz. Você pode não sentir o gosto ou a sensação do medicamento, mesmo usando o inalador corretamente. Se o seu dispositivo tiver orifícios de ventilação, não os cubra enquanto inala.

4 - Retire o inalador da sua boca e sustenha a respiração durante 10 segundos, ou máximo de tempo que conseguir.

5 - Depois expire (sobre) lentamente.

6 - Se tiver que repetir, espere pelo menos 1 minuto.

7 - Enxágue a boca com água, gargareje e cuspa a água.

Como faço para limpar o inalador?

Limpe regularmente a parte externa do bocal (uma vez por semana) com um pano seco. Não lave o inalador de pó seco com água nem o coloque debaixo d'água.

Quais efeitos indesejados este medicamento pode provocar?

Cefaleia, Candidíase na boca e/ou garganta, rouquidão, câimbras musculares e pneumonia em pacientes com DPOC.



E se eu esquecer de tomar o medicamento?

Inale a dose seguinte conforme prescrição médica. Não administre dose dobrada para compensar dose esquecida.

Onde e como devo guardar e/ou desprezar o medicamento?

Mantenha o medicamento na embalagem original e em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). Proteja-o da umidade.

Após aberto, o produto deve ser utilizado em até 2 meses. Para dispositivos multidoses, observe o contador para acompanhar número de doses restantes.



Nome do medicamento descrito na receita médica:

Lembre-se: A utilização de dispositivos inalatórios é uma habilidade que deve ser desenvolvida para que as medicações sejam administradas com eficácia.



Em caso de dúvidas sobre medicamentos, procure o farmacêutico.

