



Serviço de Assistência Farmacêutica

Comitê de orientação e educação ao paciente, familiar ou acompanhante



REDE D'OR


rededor.com.br

 (21) 2101-2658

 3003-3230

Cuidados voltados à
administração do
**Medicamento
Oseltamivir**

REDE D'OR



Para que este medicamento é utilizado?

O Oseltamivir é indicado para o tratamento de pacientes infectados com o vírus Influenza.

Como este medicamento funciona?

O Oseltamivir é um inibidor da enzima neuraminidase, que é fundamental para a replicação do vírus.

Como devo tomar esse remédio?

O regime de tratamento recomendado é de 5 dias, com administração a cada 12 horas.

Instruções para diluição da cápsula de Oseltamivir quando necessário:

1 - Segure uma cápsula de Oseltamivir nas doses de 30 mg, 45 mg ou 75 mg sobre um copo limpo de vidro. Abra cuidadosamente a cápsula e despeje todo o seu conteúdo no fundo do copo.

2 - Utilizando uma seringa graduada de 5 mL, aspire 5 mL de água filtrada ou fervida (em temperatura ambiente) e adicione ao pó no copo.

3 - Mexa a mistura com uma colher limpa por aproximadamente 2 minutos.

A concentração da suspensão preparada está detalhada na tabela abaixo:

- Cápsula de 30 mg: Concentração de 6 mg/mL
- Cápsula de 45 mg: Concentração de 9 mg/mL
- Cápsula de 75 mg: Concentração de 15 mg/mL

4 - Aspire com a seringa a quantidade prescrita para o paciente, conforme a orientação médica.

5 - Não é necessário remover qualquer pó branco não dissolvido que permaneça no fundo do copo; descarte o que sobrar. Repita esse processo a cada administração do medicamento para a criança.

E se eu esquecer de tomar o medicamento?

Dica: programe um alarme pode te ajudar a lembrar de tomar o remédio nos dias e horários prescritos pelo médico.

Quais efeitos indesejados este medicamento pode provocar?

- Náuseas: Um dos efeitos mais frequentes, que pode ser reduzido se o medicamento for tomado com comida.
- Vômitos: Também costuma ocorrer, especialmente em crianças.
- Diarreia: Algumas pessoas podem experimentar fezes soltas.
- Dor abdominal: Desconforto gastrointestinal pode ser relatado.

Onde e como devo guardar e/ou desprezar o medicamento?

Armazene o medicamento em temperatura ambiente, longe de umidade e calor excessivo. O ideal é mantê-lo em um local seco e fresco, em torno de 15 a 30 °C.

Lembre-se: o sucesso do tratamento não depende exclusivamente do uso de medicamentos; portanto, associá-lo a uma alimentação adequada é fundamental.



Em caso de dúvidas sobre medicamentos, procure o farmacêutico.

