

Para que este medicamento é utilizado?

Indicado para o controle e prevenção da asma brônquica, bem como para o tratamento de outras condições nas quais possa ocorrer obstrução reversível das vias aéreas, tais como bronquite crônica e enfisema.

Como este medicamento funciona?

O salbutamol é um broncodilatador que relaxa a musculatura das paredes dos brônquios, ajudando a abrir as vias aéreas e tornando mais fácil a entrada e a saída de ar dos pulmões. O tempo para início de ação do sulfato de salbutamol é cerca de 5 minutos. Os efeitos do salbutamol duram em torno de 4 a 6 horas.



Serviço de Assistência Farmacêutica

Comitê de orientação e educação ao paciente, familiar ou acompanhante



REDE D'OR



rededor.com.br

 (21) 2101-2658

 3003-3230

Cuidados voltados à administração de
**Inalatório Oral:
Salbutamol**

REDE D'OR

Como devo tomar esse remédio?

Inaladores de dispositivos pressurizados dosimetrados

É recomendado o uso de espaçadores, pois aumenta a efetividade e segurança do tratamento. Principalmente para crianças e idosos.

Como usar o inalador?

1 - Remova a tampa do bocal apertando as laterais e verifique se o interior e o exterior do bocal estão limpos. Agite bem o inalador;

2 - Encaixe a aerocâmara no bocal do spray. Segure o inalador na posição vertical entre o dedo indicador e o polegar (que deve ficar na base, abaixo do bocal).


3 - Expire lentamente até expelir todo o ar dos pulmões.

4 - Coloque o bocal da aerocâmara na boca, apertando-os bem, mas sem morder, mantenha a língua longe da abertura do bocal e dispare um jato. Puxe o ar lentamente e então segure a respiração contando mentalmente até dez (caso tenha dificuldade em fazer esforço, pode respirar normalmente na aerocâmara durante 10 segundos após cada jato).

5 - Puxe o ar pela boca e solte pelo nariz se não tiver válvula (espaçador sem válvula).

6 - Para liberar o segundo jato, mantenha o inalador na posição vertical e espere cerca de meio minuto antes de repetir os passos 3 a 5.

7 - Recoloque a tampa do bocal do medicamento empurrando-a firmemente e prendendo-a na posição correta.



8 - Se o seu inalador contiver um medicamento esteroide (às vezes chamado de glicocorticoide ou corticosteroide), enxágue a boca e gargareje com água após o uso. Em seguida, cuspa a água. Não engula.

Como faço para limpar o inalador?

Lave o inalador pelo menos uma vez por semana. Retire o frasco de alumínio do recipiente plástico e remova a tampa do bocal. Enxágue com bastante água corrente morna, um detergente neutro pode ser adicionado à água. Enxágue bem com água limpa antes de secar. Não ponha o frasco de alumínio na água e seque o interior e o exterior do recipiente plástico. Recoloque o frasco de alumínio e a tampa do bocal.

Quais efeitos indesejados este medicamento pode provocar?

Tremor, dor de cabeça e taquicardia.

E se eu esquecer de tomar o medicamento?

Inale a dose seguinte conforme prescrição médica. Ou antes, se estiver com falta de ar e exista recomendação do médico para uso do medicamento nessa condição.

Onde e como devo guardar e/ou desprezar o medicamento?

O produto deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura entre 15°C e 30°C, protegido da luz solar direta e do congelamento.

Alguns inaladores vêm com um contador de doses integrado. O contador registra quantas doses ainda restam no inalador. Quando o contador marcar 0 (zero), não há mais medicamento, portanto, deve ser descartado.

Se o seu inalador não tiver um contador embutido, anote a data de início de uso. Você precisa acompanhar o número de doses restantes com base na frequência de uso.

Nome do medicamento descrito na receita médica:

Lembre-se: A utilização de dispositivos inalatórios é uma habilidade que deve ser desenvolvida para que as medicações sejam administradas com eficácia.



Em caso de dúvidas sobre medicamentos, procure o farmacêutico.

