

Serviço de Assistência Farmacêutica

Comitê de orientação e educação ao
paciente, familiar ou acompanhante

REDE *D'OR*

rededor.com.br


 **(21) 2101-2658**

 **3003-3230**

Cuidados voltados
ao uso de
**Hipoglicemiantes ou
Antidiabéticos Orais**



REDE *D'OR*



Para que este medicamento é utilizado?

É indicado para o controle da glicose (açúcar) no sangue (glicemia = nível de glicose no sangue), no tratamento e prevenção da Diabetes mellitus tipo 2 (DM 2) e como complemento a insulinoterapia.

Como este medicamento funciona?

Os hipoglicemiantes orais possuem classes ou “famílias”, que atuam de formas diferentes no organismo.

No entanto, todos possuem o papel de reduzir a glicemia, sendo as principais formas de ação:

- Reduzindo a produção de glicose pelo fígado;
- Aumentando a sensibilidade a insulina e assim promovendo a captação da glicose periférica (retirando a glicose do sangue e utilizando-a no músculo esquelético);
- E/ou estimulando a produção e secreção de insulina pelo pâncreas.

Dica: mantenha seu controle glicêmico, realize exames de monitoramento da função renal e hepática, acompanhe os níveis de vitamina B12 e cálcio.


Como devo tomar esse remédio?

É administrado por via oral, preferencialmente com água e seguido de uma refeição, para que possa reduzir os efeitos indesejáveis e evitar o risco de hipoglicemia severa.

Quais efeitos indesejados este medicamento pode provocar?

As reações adversas mais comuns são: distúrbio gastrointestinal (náusea, vômito, diarreia, dor abdominal e inapetência).

Estas reações ocorrem mais frequentemente durante o início do tratamento e regredem espontaneamente na maioria das vezes.



Um aumento gradual da dose também pode melhorar a tolerabilidade gastrointestinal), distúrbios do paladar, redução e ganho de peso.

E se eu esquecer de tomar o medicamento?

Caso você esqueça uma dose, tome-a assim que lembrar. No entanto, se estiver próximo do horário da próxima dose, tome apenas esta próxima dose, a fim de evitar a administração em dobro.

Não utilize a dose duplicada para compensar doses esquecidas.

Dica: programe um alarme pode te ajudar a lembrar de tomar o remédio nos dias e horários prescritos pelo médico.

Onde e como devo guardar e/ou desprezar o medicamento?

Seu medicamento deve ser mantido a temperatura ambiente (entre 15 e 30° C) e proteger da umidade e luz.

Atente-se a data de validade do seu medicamento, ela está na caixa e no blister. Como dica, a fim de garantir as informações do seu medicamento, inicie pela parte superior do blister, assim mantém a data de validade do medicamento íntegra para consulta.

Caso identifique mudança na coloração do medicamento, comprimidos degradados ou amolecidos, corpos estranhos ou qualquer outro tipo de alteração no seu medicamento, entre em contato imediatamente com o fabricante ou local onde comprou a medicação.

Nome do medicamento descrito na receita médica:

Sempre consulte o médico antes de introduzir algum desses medicamentos.



Em caso de dúvidas sobre medicamentos, procure o farmacêutico.