


35b

Distúrbios Hemorrágicos do Recém-Nascido



Terapia

Algoritmo de diagnóstico e terapia da Trombocitopenia neonatal




Terapia

Distúrbio hemorrágico por deficiência de vitamina K

Profilaxia e terapêutica de acordo com as formas variáveis

Formas Variáveis	Precoce	Clássica	Tardia
Período do aparecimento	1º dia	1ª semana	Entre a 2ª e a 12ª semana
Profilaxia	Vitamina K, no pós-natal, 1 mg IM, IV ou SC	Vitamina K no pós-natal, 1 mg IM, IV ou SC	Vitamina K no pós-natal, 1 mg IM, IV ou SC
Terapêutica	1. Suspende medicamentos 2. Vitamina K 5 mg/dia (2 a 10 mg) 3. Plasma fresco congelado – 10 a 20 ml/kg	1. Vitamina K 1 mg (1 a 5 mg) IM ou SC 2. Plasma fresco congelado – 10 a 20 ml/kg, se aplicável	1. Vitamina K 1 mg e após 1 mg IM ou SC cada 4 semanas 2. Plasma fresco congelado – 10 a 20 ml/kg, se aplicável


Coagulação intravascular disseminada (algoritmo de abordagem terapêutica)



TP: tempo de protrombina • TTPA: tempo de tromboplastina parcial ativada
PDF: produtos de degradação da fibrina • CP: contagem de plaquetas

Terapia

Algoritmo de abordagem ao RN com sangramento



GI: gastrointestinal • HMG: hemograma • CP: contagem de plaquetas
HIC: hemorragia intracraniana

Terapia

Indicação de transfusão de concentrado de plaquetas

