

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
AAS Infantil	Ácido Acetilsalicílico	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Ácido Folínico	Ácido Folínico	Cápsula	X		Diluir cada cápsula em 15 ml de água filtrada. (1 cáp = 15mg)	***
Adalat ®	Nifedipino	Cápsula		X	Redução da biodisponibilidade e eficácia O conteúdo pode aderir-se a parede sonda causando obstrução.	Anti-hipertensivos bloqueadores do canal de cálcio. Discutir terapia com o prescritor.
Adalat retard ®	Nifedipino	Comprimido revestido		X	Perderá sua característica de liberação controlada; levando ao risco de toxicidade, além do risco de obstrução da sonda.	Anti-hipertensivos bloqueadores do canal de cálcio. Discutir terapia com o prescritor.
Adtil ®	Retinol + Colecalciferol	Solução oral (gotas)	X		Diluir a posologia prescrita em 5ml de água filtrada.	***
Addera D3 ®	Colecalciferol	Comprimido revestido		X	A perda das características de revestimento pode prejudicar o efeito farmacológico.	Solução em gotas.
Akineton ®	Cloridrato de biperideno	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 20mL de água destilada.	***
Aldactone®	Esprironolactona	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	Substituição por suspensão oral para administração precisa de doses pediátricas.
Aldomet®	Metildopa	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Alivium ® 50mg/ml	Ibuprofeno	Solução oral (gotas)	X		Diluir a posologia prescrita em 5ml de água filtrada.	***
Allegra ®	Fexofenadina	Comprimido revestido		X	O medicamento possui revestimento que quando triturado pode obstruir o acesso enteral. Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Claritin® solução ou Allegra® solução
Amaryl®	Glimepirida	Comprimido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Sugestão: Discutir com prescritor Risco x Benefício.

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Aminofilina	Aminofilina	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Amoxil®	Amoxicilina	Cápsula		X	Não recomendado via sonda, sugerir substituição.	Alternativa: Suspensão Oral
Amoxil®	Amoxicilina	Suspensão Oral	X		Amoxil suspensão 250mg/5ml - diluir o pó para reconstituição do medicamento conforme orientação do fabricante e administrar a solução reconstituída diretamente via sonda conforme posologia prescrita	***
Ampectil®	Clorpromazina	Solução Oral	X		Diluir a dose prescrita em 15ml de água filtrada.	***
Amytril®	Amitriptilina	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Anafranil®	Clomipramina	Drágea	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Ancoron®	Cloridrato de amiodarona	Comprimido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Suspensão Oral
Ancoron®	Cloridrato de amiodarona	Suspensão Oral (gotas)	X		A cada 6 gotas do medicamento diluir em 20ml de água destilada.	***
Annita®	Nitazoxanida	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Ansitec®	Cloridrato de buspirona	Comprimido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Apresolina®	Hidralazina	Drágea	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	A trituração pode acarretar na degradação de princípio ativo, monitorar pressão arterial.
Aradois	Losartana	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Aristab®	Aripiprazol	Comprimido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Aropax®	Paroxetina	Comprimido revestido		X	Possui revestimento e excipientes que podem obstruir a sonda.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Artrolive®	Sulfato de Glicosamina + Sulfato de Condroitina	Cápsula	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	
Aspirina prevent®	Ácido acetilsalicílico	Comprimido revestido		X	A perda do revestimento entérico pela trituração pode propiciar a inativação do princípio ativo ou ainda favorecer a irritação da mucosa gástrica.	AAS Infantil ®
Atacand®	Candesartana	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Atenol®	Atenolol	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Atensina®	Clonidina	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Avalox®	Moxifloxacino	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10-20mL de água destilada.	***
Azi	Azitromicina	Comprimido revestido		X	Triturar o comprimido causa perda do revestimento, podendo diminuir a eficácia terapêutica e obstruir a sonda.	Azitromicina (40mg/mL) Suspensão oral; Avaliar o uso alternativo da apresentação endovenosa (Diluição em 250 a 500mL S.F. 0,9% ou S.G. 5%, infundir no mínimo em 1 hora)
Azulfin®	Sulfasalazina	Comprimido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Bactrim® /Bactrim F®	Sulfametoxazol + trimetoprima	Comprimido		X	O princípio ativo e os excipientes quando macerados podem causar obstrução da sonda.	Solução Oral
Bactrim®	Sulfametoxazol + trimetoprima	Solução oral	X		***	***
Bamifix®	Cloridrato de bamifilina	Drágea	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Beneroc®	Complexo B	Drágea		X	Possui revestimento e excipientes que podem obstruir a sonda.	Solução Oral (Xarope) /Forma farmacêutica E.V
Benerva®	Tiamina (Vit B1)	Comprimido revestido	X		Monitorar possíveis reações adversas do TGI	***
Benicar®	Olmesartana	Comprimido revestido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Benicar HCT	Hidroclorotiazida + Olmesartana medoxomila	Comprimido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Bicarbonato de sódio	Bicarbonato de sódio	Pó	X		A cada 2 gramas diluir em 25ml de água. Administrar imediatamente.	***
Biozic®	Zinco	Solução Oral	X		***	***
Brilinta®	Ticagrelor	Comprimido revestido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Brintellix®	Bromidrato de vortioxetina	Comprimido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Brometo de Propantelina	Brometo de Propantelina	Cápsula		X	O conteúdo da cápsula não pode ser removido.	Solução Oral
Brometo de Propantelina	Brometo de Propantelina	Solução Oral	X		***	***
Buclina®	Buclizina	Comprimido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	O médico responsável deve avaliar Risco x Benefício.
Bup®	Bupropiona	Comprimido revestido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	O médico responsável deve avaliar Risco x Benefício.
Buscopan Simples®	Escopolamina	Drágea	X		Triturar e diluir o medicamento em 20ml de água destilada.	Solução Oral (gotas)
Buscopan Composto®	Dipirona sódica+Escopolamina	Comprimido revestido		X	A perda do revestimento pode obstruir a sonda.	Solução Oral (gotas)
Calcort®	Deflazacorte	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Canalte®	Polistirenosulfonato de cálcio	Pó		X	Risco de obstrução da sonda por característica físico químicas do medicamento.	Uso via retal.

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Captopril®	Captopril	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 20-30ml de água destilada.	***
Carbonato de cálcio	Carbonato de cálcio	Cápsula	X		Diluir cada cápsula em 10 ml de água filtrada.(1 cáp = 500mg)	***
Carbolitium®	Carbonato de Lítio		x		Triturar e diluir o medicamento em 20mL de agua destilada.	***
Cardizem®	Diltiazem	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de agua destilada.	***
Carvão Ativado	Carvão Ativado	Pó	X		O medicamento não deve ser triturado devido à falta de estudos que comprovem a segurança e eficácia.	O médico responsável deve avaliar Risco x Benefício.
Carvedilol®	Carvedilol	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de agua destilada.	***
Cebralat®	Cilostazol	Comprimido	X		***	***
Cefadroxil®	Cefadroxila	Comprimido revestido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Suspensão Oral
Cefaliv	Mesilato de diidroergotamina + Dipirona ou metamidazol + Cafeína	Comprimido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Cellcept®	Micofenolato de Mofetila	Comprimido revestido		X	Risco Carcinogênico.	***
Cewin®	Ácido ascórbico	Comprimido		X	Os comprimidos são de liberação prolongada e possuem hidroxipropilmetilcelulose (quando misturada em água confere viscosidade) e ácido ascórbico (pode sofrer degradação na presença de umidade) em sua composição, ocasionando risco de obstrução da sonda.	Cewin Gotas®.
Cipramil®	Citalopram	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de agua destilada.	***

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Cipro®	Ciprofloxacina	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento, no mínimo, em 50 ml de água destilada.	***
Citoneurin®	Cianocobalamina + piridoxina + tiamina	Drágea		X	Medicamento possui revestimento e excipientes que podem obstruir a sonda quando macerados.	Alternativa: Solução oral manipulada / Forma farmacêutica IM.
Claritin®	Loratadina	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Claritromicina®	Claritromicina	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Clavulin®	Ácido clavulânico + amoxicilina	Comprimido revestido		X	A perda das características de revestimento pode prejudicar o efeito farmacológico.	Suspensão oral
Clavulin®	Ácido clavulânico + amoxicilina	Suspensão Oral	X		***	***
Clorana®	Hidroclorotiazida	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Codein®	Codeína	Solução Oral	X		***	***
Colchis®	Colchicina	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. Administrar imediatamente.	***
Coltrax®	Tiocolchicosídeo	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral.	***
Combiron fólico®	Ferrocobalmina+ Associações	Drágea		X	O medicamento possui revestimento que quando triturado pode obstruir o acesso enteral. Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Solução Oral (gotas)
Complexo B	Complexo B	Solução Oral (Xarope)	X		***	***

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Comtan®	Entacapona	Comprimido revestido	X		Agitar em 10mL de água filtrada até dissolução completa (5min). Não triturar/macerar	
Coumadin® /Marevan®	Varfarina	Comprimido	X		Dispensar os comprimidos em 5 minutos.	***
Combodart®	Dutasterida/Tansulosina	Cápsula		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Solução oral manipulada.
Concor®	Bisoprolol	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	
Cozaar®	Losartana	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Creon®	Pancreatina	Cápsula		X	Medicamento possui grânulos que não devem ser macerados, devido à perda da eficácia	O médico responsável deve avaliar Risco x Benefício.
Crestor®	Rosuvastatina	Comprimido revestido	X		O comprimido pode ser disperso em 10mL de água em cerca de 5 minutos	***
Cymbalta®	Duloxetina	Cápsula		X	Quando macerados os grânulos podem causar obstrução da sonda	Alternativa: solução oral manipulada.
Dactil OB®	Piperidolato + Hesperidina + ácido Ascórbico	Drágea		X	Medicamento possui revestimento e excipientes que podem obstruir a sonda quando macerados.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Daflon®	Diosmina + Hesperidina	Comprimido revestido		X	Medicamento possui revestimento e excipientes que podem obstruir a sonda quando macerados.	***
Dalacin C®	Clindamicina	Cápsula	X		Dissolver o conteúdo da cápsula em 15mL de água filtrada. Administrar imediatamente.	***
Daonil®	Glibenclamida	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Dalmadorm®	Flurazepan	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	
Decadron®	Dexametasona	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Decadron® Elixir	Dexametasona	Elixir	X		***	Alternativa: Elixir
Dequadin®	Dequalíneo + benzocaína	Pastilha		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Depakene®	Ácido valpróico	Cápsula (250mg)/ Comprimido revestido (500mg)		X	Pode ocorrer irritação do TGI.	Alternativa: Xarope
Depakene®	Ácido valpróico	Xarope	X		***	***
Depakote®	Divalproato de sódio	Comprimido		X	Pode ocorrer irritação do TGI.	Sugerir alternativa de ácido valpróico solução.
Dexilant®	Dexlansoprazol	Cápsula de Liberação Retardada		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Diamicron MR®	Glicazida	Comprimido liberação prolongada		X	A perda do revestimento durante a trituração prejudica a liberação controlada levando ao risco de toxicidade, alteração na farmacocinética e risco de obstrução do acesso enteral.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Diamox ®	Acetazolamida	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Dienpax®	Diazepan	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Digesan®	Bromoprida	Cápsula	X		Dissolver o conteúdo da cápsula em 15mL de água filtrada. Administrar imediatamente.	Alternativa: Solução Oral gotas
Digoxina®	Digoxina	Comprimido		X	Não recomendado visto baixo índice terapêutico e necessidade de doses precisas.	Alternativa: Digoxina Elixir
Dilacoron®	Verapamil	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Dimorf®	Sulfato de morfina	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Diovan®	Valsartana	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Donaren®	Cl. Trazodona	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Dormire®	Midazolam	Solução Oral	X		A cada 1mL ou 20 gotas diluir em 10mL de água filtrada.	***
Dormonid®	Midazolam	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	Alternativa: Solução Oral
Dostinex®	Cabergolina	Comprimido		X	O medicamento não deve ser triturado devido à falta de estudos que comprovem a segurança e eficácia.	O médico responsável deve avaliar Risco x Benefício.
Doxiciclina	Doxiciclina	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Dramin B6®	Dimenidrinato + piridoxina	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. (Utilizar opção gotas)	Alternativa: Solução Oral Gotas
Dramin B6®	Dimenidrinato + piridoxina	Solução oral gotas	X		A cada 1ml do medicamento diluir em 10ml de água filtrada.	
Dulcolax®	Bisacodil	Drágea		X	O medicamento possui revestimento que quando triturado pode obstruir o acesso enteral.	Bisacodil solução manipulada.
Duspatalin®	Mebeverina	Cápsula		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Ebix®	Memantina	Comprimido revestido	X		Trituração (Adicionar 10ml de água destilada no triturador, lavando bem as paredes e mexer até dissolver o comprimido triturado).	***

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Efexor XR®	Venlafaxina	Cápsula		X	Não deve ser triturado, pois perde as características de liberação controlada levando ao risco de toxicidade, manutenção inadequada do nível sérico do fármaco, além do risco de obstrução da sonda.	Solução Oral manipulada.
Effient®	Prasugrel	Comprimido revestido		X	O medicamento não deve ser triturado devido à falta de estudos que comprovem a segurança e eficácia	O médico responsável deve avaliar Risco x Benefício.
Eliquis®	Apixabana	Comprimido revestido		X	O medicamento não deve ser triturado devido à falta de estudos que comprovem a segurança e eficácia	O médico responsável deve avaliar Risco x Benefício.
Endofolin®	Ácido fólico	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Entresto®	Sacubitril valsartana sódica hidratada	Comprimido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Ephynal®	Tocoferol	Cápsula gelatinosa		X	A dose extraída pode ser incompleta além do risco de obstrução do acesso	Alternativa: xarope.
Equilid®	Sulpirida	Cápsula		X	O medicamento não deve ser triturado devido à falta de estudos que comprovem a segurança e eficácia.	O médico responsável deve avaliar risco x benefício.
Eranz®	Donepezila	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Etna	Vitamina B12 (hidroxocobalamina) + Uridina + Citidina	Cápsula		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Ezetrol®	Ezetimiba	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente	***

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Fenergan®	Cl. Prometazina	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Flagyl®	Metronidazol	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Flaxin®	Finasterida	Comprimido revestido		X	Não recomendado. Risco ocupacional para o manipulador.	Solução oral manipulada.
Floratil®	Saccharomyces boulardii	Cápsula	X		Diluir o conteúdo da cápsula em 10-20mL de água filtrada. Administrar imediatamente.	***
Florinefe®	Fludrocortisona	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Floxacin®	Norfloxacino	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Fluimucil®	Acetilcisteína	Envelope	X		Diluir cada envelope de 5 gramas em 50ml de água filtrada.	***
Fósforo Orgânico	Fósforo Orgânico	Cápsula	X		Diluir o conteúdo da cápsula em 15mL de água destilada. Administrar imediatamente.	***
For gas®	Simeticona	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
For gas®	Simeticona	Emulsão Oral	X		Diluir a dose prescrita em 20mL de água destilada.	***
Forxiga®	Dapagliflozina	Comprimido revestido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Frisium®	Clobazam	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Frontal®	Alprazolam	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Galvus®	Vidagliptina	Comprimido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Gardenal®	Fenobarbital	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. Administrar imediatamente.	Preferência: Solução Oral.
Gardenal®	Fenobarbital	Solução Oral gotas	X		A cada 20 gotas diluir em 20ml de água.	
Glifage®	Metformina	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 20ml de água mineral. Administrar imediatamente.	
Glifage XR ®	Metformina	Comprimido revestido.	X		Perde as características de liberação prolongada.	
Haldol®	Haloperidol	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. Administrar imediatamente.	Alternativa: Solução Oral Gotas
Hepa merz®	Aspartato de Orinitina	Envelope	X		Diluir cada envelope de 30ml de água filtrada. Aguardar 2 minutos para completa dispersão.	***
Hidantal®	Fenitoína	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Hidroxicloroquina	Sulfato de hidroxicloroquina			X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Higroton®	Clortalidona	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Hixizine®	Hidroxizina	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Hixizine®	Hidroxizina	Suspensão Oral	X		A cada 5ml diluir em 10ml água filtrada.	***
Humectol D®	Docusato sódico + bisacodil	Comprimido revestido		X	Os comprimidos apresentam revestimento entérico, não podendo ser triturados.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Imosec®	Ioperamida	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Imuran®	Azatioprina	Comprimido revestido		X	Medicamento não deve ser macerado por possuir risco carcinogênico. Risco ocupacional para o manipulador.	***
Indocid®	Indometacina	Cápsula		X	Princípio ativo insolúvel em água pode causar obstrução da sonda.	Solução oral manipulada /Supositório
Inibida®	Isoxuprina	Comprimido		X	O medicamento não deve ser triturado devido à falta de estudos que comprovem a segurança e eficácia.	O médico responsável deve avaliar risco x benefício.
IONCLOR®	Cloreto de potássio	Solução	X		Diluir a posologia prescrita em 5ml de água filtrada.	***
Isordil SL®	Isossorbida (dinitrato)	Comprimido		X	Comprimido para administração sublingual. Não há indicação de uso por outras vias	Isordil®
Isordil®	Isossorbida (dinitrato)	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Januvia®	Sitagliptina	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Jardiance®	Empagliflozina	Comprimido revestido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Kaletra®	Ritonavir + lopinavir	Comprimido revestido		X	A perda das características de revestimento pode prejudicar o efeito farmacológico.	Solução Oral
Keforal/Keflex®	Cefalexina	Drágea		X	Alto risco de obstrução do acesso enteral.	Suspensão Oral
Keflex®	Cefalexina	Suspensão Oral	X		A cada 10ml (500mg) da suspensão diluir em 20-50mL de água.	***
Kepra®	Levetiracetam	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Klaricid®	Clarithromicina	Cápsula de Liberação prolongada		X	A perda do revestimento durante a trituração prejudica a liberação controlada do medicamento	Klaricid Suspensão
Klaricid®	Clarithromicina	Suspensão Oral	X		A cada 5ml (20mg) da suspensão diluir em 20-50mL de água.	***
Labirin®	Betaistina	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10mL de água destilada.	***
Lactofos®	Lactobacilos	Envelope	X		***	***
Lactulona®	Lactulose	Xarope	X		Diluir a dose prescrita em 5ml de água filtrada.	***
Lamictal®	Lamotrigina	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10mL de água destilada.	***
Lasix®	Furosemida	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água.	***
Levaquim®	Levofloxacina	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água.	***
Lexapro®	Escitalopram	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10mL de água destilada.	***
Lexotan®	Bromazepam	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Lioresal®	Baclofeno	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10mL de água destilada.	***
Lipless®	Ciprofibrato	Comprimido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Lipidil®	Fenofibrato	Cápsula		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Lipitor®	Atrovastatina	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10mL de água destilada.	**
Lisador®	Adifenina + prometazina + dipirona	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 20ml de água mineral. Administrar imediatamente.	Alternativa: Dorilen® gotas
Livalo®	Pitavastatina	Comprimido revestido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Lixiana®	Edoxabana	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10mL de água destilada.	***
Lorax®	Lorazepam	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10mL de água destilada.	***
Losec Mups®	Omeprazol	Cápsula	X		Dissolução (dissolver em 10 ml de água filtrada e aguardar 20 minutos para completa dispersão .	***
Lyrica®	Pregabalina	Cápsula	X		Dissolver em 10 ml de água filtrada e aguardar 2 minutos para completa dispersão do comprimido.	***
Maalox®	Hidróxido de Alumínio	Suspensão Oral		X	Características físicas e químicas contraindicam.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Macroantina®	Nitrofurantoína	Cápsula	X		Diluir o conteúdo da cápsula em 20ml de água mineral. Administrar imediatamente após completa dissolução do medicamento.	***
Magnen B6	Magnésio + Vitamina B6 (Piridoxina)	Comprimido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Mantidan®	Cl. Amantadina	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10mL de água destilada.	***
Marevan®	Varfarina	Comprimido	X		Dispersar os comprimidos em 5 minutos.	***
Meclin®	Meclizina	Comprimido		X	O medicamento não deve ser triturado devido à falta de estudos que comprovem a segurança e eficácia	O médico responsável deve avaliar risco x benefício.
Mesacol®	Mesalazina	Comprimido		X	Há risco de perda da eficácia.	Mesalazina solução manipulado / Supositório
Mestinon	Piridostigmina	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10mL de água destilada.	***

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Metamucil®	Mucilóide hidrofílico de psílio	Pó para preparação extemporânea		X	Risco de obstrução da sonda.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Metronidazol	Metronidazol	Cápsula		X	Conteúdo da cápsula não pode ser removido.	Solução Oral
Meticorten®	Prednisona	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10mL de água destilada.	***
Micardis®	Telmisartana	Comprimido	X		Dispersar os comprimidos em 5 minutos.	***
Miosan®	Ciclobenzaprina	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada. Administrar imediatamente.	***
Moduretic®	Hidroclorotiazida+ amilorida	Comprimido	X		Dissolver em 10 ml de água filtrada e aguardar 2 minutos para completa dispersão do comprimido.	***
Monocordil®	Mononitrato de isossorbida	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10mL de água destilada.	***
Motilium®	Domperidona	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Motilium®	Domperidona	Suspensão Oral	X		Diluir cada 10ml em 10ml de água filtrada. Administrar imediatamente.	***
Muvinlax®	Macrogol+bicarbonato de sódio+cloreto de sódio+cloreto de potássio	Pó	X		Diluir em 50ml de água filtrada.	***
Myrbetric®	Mirabegrona	Comprimido revestido		X	Fórmula farmacêutico de liberação prolongada. Quando triturado, o medicamento perde a eficácia.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Myfortic®	Micofenolato de Mofetila	Comprimido revestido		X	Medicamento não deve ser macerado por possuir risco carcinogênico. Risco ocupacional para o manipulador.	***
Mytedon®	Metadona	Comprimido	X		Recomenda-se administrar imediatamente após a trituração, em sondas muito finas pode causar obstrução.	***
Naprix®	Ramipril	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10mL de água destilada.	***
Naramig®	Cloridrato de naratriptana	Comprimido revestido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Nausebron®	Ondansetrona	Comprimido	X		Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Forma farmacêutica EV
Nebilet®	Nebivolol	Comprimido	X		Diluir o medicamento em 15ml de água mineral sem triturar. Aguardar por 5 minutos até a completa dissolução. Administrar imediatamente.	***
Nesina®	Alogliptina	Comprimido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Neozine®	Levomepromazina	Solução	X		A cada 40 gotas do medicamento diluir em 10ml de água filtrada. Administrar imediatamente.	***
Neo Fedipina	Nifedipino	Comprimido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Neovite	Zinco + Vitamina E + Vitamina C + Zeaxantina + Luteína	Cápsula	X		Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Neuleptil®	Pericizina	Solução	X			
Neurontin®	Gabapentina	Cápsula	X		Dissolver em 10 ml de água filtrada e aguardar 2 minutos para completa dispersão do comprimido.	***

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Neutrofer®	Glicinato Férrico	Comprimido revestido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Solução
Nexium®	Esomeprazol de magnésio	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 20mL de água destilada.	***
Noripurum®	Ferripolimaltose	Solução	X		A cada 20 gotas da solução oral diluir em 10-20mL de água.	
Noripurum®	Ferripolimaltose (ferro III)	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 20-50mL de água destilada.	
Norvasc®	Anlodipino	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Novalgina®	Dipirona	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	Alternativa: Solução oral gotas
Novalgina®	Dipirona	Solução oral (gotas)	X		A cada 20 gotas da solução oral diluir em 10-20mL de água.	***
Novanlo®	Levanlodipino	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Óleo Mineral®	Óleo Mineral		X		Características físicas e químicas contraindicam.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Omic Ocas®	Tamsulosina	Comprimido revestido		X	A maceração e solubilização do princípio ativo não são recomendadas.	Solução oral manipulada
Os-cal D®	Carbonato de cálcio + Vit. D	Comprimido revestido		X	Grande risco de obstruir a sonda.	Forma farmacêutica líquida manipulada - princípios ativos separados.
Oxigen ®	Nimodipino	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 20ml de água destilada.	***
Oxycontin®	Oxicodona	Comprimido revestido		X	Não deve ser triturado, pois perde as características de liberação controlada levando ao risco de toxicidade e manutenção inadequada do nível sérico do fármaco.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Pamelor®	Nortriptilina	Cápsula	X		Dissolver o conteúdo da cápsula em 15mL de água filtrada. Administrar imediatamente.	***
Pantozol®	Pantoprazol	Comprimido		X	A perda do revestimento entérico pela trituração pode propiciar a inativação do princípio ativo ou ainda favorecer a irritação da mucosa gástrica.	Nexium® comprimido
Pentoxifilina®	Pentoxifilina	Comprimido		X	O comprimido possui núcleo que impede a liberação imediata do medicamento, causando alteração na eficácia.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Pentasa® 2g	Mesalazina	Sachê		X	Não recomendado, risco de obstrução de sonda	Mesalazina solução oral / Supositório
Pidomag®	Pidolato de magnésio	Solução	X		***	***
Plaquinol®	Hidroxicloroquina	Comprimido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Plantaben®	Plantago Ovata	Envelope		X	Grande risco de obstruir a sonda.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Plasil®	Metoclopramida	Comprimido		X	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral.	Preferência: Solução Oral (Vamistop)
Plavix®	Clopidogrel	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água destilada.	***
Polaramine®	Maleato de dexclorfeniramina	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 20ml de água filtrada.	***
Pradaxa®	Dabigatrana	Cápsula		X	O medicamento não deve ser triturado ou diluído devido ser encapsulado com ácido tartárico. Deve ser administrado intacto.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Predsim®	Prednisona	Solução Oral	X		***	***

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Primid®	Primidona	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água destilada.	
Pristiq®	Desvenlafaxina	Comprimido revestido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Procoralan®	Ivabradina			X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Profenid®	Cetoprofeno	Cápsula	X		Dissolver em 10 ml de água filtrada e aguardar 2 minutos para completa dispersão do comprimido.	***
Prograf®	Tacrolimus	Cápsula	X		Dissolver em 10 ml de água filtrada e administrar imediatamente.	***
Prolive	Lactobacillus acidophilus (Bacilos lácticos)	Cápsula		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Prolopa®	Benserazida + levodopa	Comprimido	X		Dissolver em 10 ml de água filtrada e administrar imediatamente.	***
Prolopa BD®	Benserazida + levodopa	Comprimido		X	Não recomendado, visto característica de liberação controlada de que será perdida após maceração.	Prolopa®
Propranolol®	Propranolol	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água destilada.	***
Prozac®	Fluoxetina	Cápsula	X		Dissolver o conteúdo da cápsula em 15mL de água filtrada. Administrar imediatamente.	***
Puran T4®	Levotiroxina sódica	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10mL de água destilada.	***
Pyridium®	Fenazopiridina	Drágea	X		Dilui em volume igual ou maior que 20mL.	***

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Questran ligth®	Colestiramina	Pó	X		Diluir o medicamento em 20ml de água mineral e aguardar 2 minutos para sua completa dissolução.	***
Redoxon®	Ácido Ascórbico	Comprimido efervescente	X		Deixar o comprimido efervescer em 50mL de água.	
Remeron Soltab®	Mirtazapina	Comprimido orodispersível		X	Não deve ser macerado, pois perde as características de liberação controlada levando ao risco de manutenção inadequada do nível sérico do medicamento, além de que, quando diluído em água forma sedimentos com alto risco de entupimento da sonda.	Solução Oral gotas.
Renagel®	Cloridrato de Sevelâmer	Comprimido revestido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Renitec®	Enalapril	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10mL de água destilada.	***
Retemic®	Oxibutina	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente.	***
Revectina®	Ivermectina	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada. Administrar imediatamente.	***
Resolor®	Prucaloprida	Comprimido		X	O medicamento não deve ser triturado devido à falta de estudos que comprovem a segurança e eficácia.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Rifaldin ®	Rifampicina	Cápsula		X	Preferir a Solução	

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Risperdal®	Risperidona	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10mL de água destilada. Administrar imediatamente.	***
Ritalina®	Cl. Metilfenidato	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Ritmonorm®	Cl. Propafenona	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Rivotril®	Clonazepam	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Rivotril®	Clonazepam	Solução Oral Gotas	X		Cada 40 gotas diluir em 15 ml de água de filtrada.	
Rocaltrol®	Calcitriol	Cápsula		X	Não recomendado via sonda, sugerir substituição.	Colecalciferol gotas
Rohypnol®	Flunitrazepam	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Sandimmun Neoral®	Ciclosporina	Cápsula		X	Possui risco carcinogênico, quando macerado. Risco ocupacional para o manipulador.	***
Secotex®	Tansulosina	Comprimido revestido		X	Não recomendado via sonda, pois a trituração e solubilização do princípio ativo não são recomendados.	***
Seloken®	Metoprolol	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Selozok®	Metoprolol	Comprimido		X	Risco de alterações farmacocinéticas que podem levar a bradicardia	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Seroquel®	Fumarato Quetiapina	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 20 ml de água destilada.	***
Sifrol®	Dicloridrato pramipexol	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15 ml de água destilada.	***
Sigmatriol	Calcitriol	Cápsula gelatinosa		X	Não recomendado via sonda, sugerir substituição.	Colecalciferol gotas

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Singulair®	Montelucaste	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente.	***
Singulair Baby®	Montelucaste	gRanulo/sachê	X		Dissolver seu conteúdo em 10 ml de água filtrada e aguardar 2 minutos par a completa dispersão.	***
Sidalurd®	Tizanidina	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15 ml de água destilada.	**
Sinvastacor®	Sinvastatina	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente.	**
Slow-K®	Cloreto de potássio	Drágea		X	Não recomendado pois perde a característica de liberação gradativa além de possuir revestimento que quando macerado pode obstruir a sonda.	Ionclor solução oral
Sotalol®	Cl. Sotalol	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15 ml de água destilada.	***
Sporanox®	Itraconazol	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Stanglit®	Cloridrato de pioglitazona	Comprimido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Stilnox®	Zolpidem	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Stugeron®	Cinarizina	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Sucrafilm®	Sucralfato	Cápsula		X	O conteúdo da cápsula não pode ser removido.	Suspensão Oral
Sucrafilm®	Sucralfato	Suspensão Oral	X		Diluir 1 flaconete em 15mL de água.	

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Sulfato de neomicina	Sulfato de neomicina	Cápsula		X	O conteúdo da cápsula não pode ser removido.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor Ou utilizar via sublingual.
Sumax®	Succinato de sumatriptana	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10mL de água destilada.	***
Sustrate SL®	Propatilnitrato	Comprimido sublingual		X	Não recomendado via sonda, utilizar via sublingual	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Synthroid®	Levotiroxina sódica	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada. Administrar imediatamente.	***
Tamarine®	Sene, Cássia, Fístula, Tamarindus sp, Coriandrum sativum	Cápsula		X	Alto risco de obstrução do acesso enteral.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor Ou utilizar via sublingual.
Tamarine®	Sene, Cássia, Fístula, Tamarindus sp, Coriandrum sativum	Geleia	X		Diluir 1 colher de sopa em 50mL de água filtrada.	***
Tamiflu®	Fosfato de oseltamivir	Cápsula	x		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Tamiram	Levofloxacino	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10mL de água destilada.	***
Tapazol®	Tiamazol	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	***
Tegretol®	Carbamazepina	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada.	Suspensão Oral.
Tegretol®	Carbamazepina	Suspensão Oral	X		A cada 50mL da solução diluir em 5 ml de água destilada.	***
Teolong®	Teofilina	Cápsula		X	Risco de alteração farmacocinética.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Tilatil®	Tenoxicam	Comprimido revestido		X	Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada. Administrar imediatamente.	***
Tiorfan®	Racecadotril	Cápsula	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada. Administrar imediatamente.	

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Tofranil®	Cl. Imipramina	Drágea	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada. Administrar imediatamente.	***
Topamax®	Topiramato	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada. Administrar imediatamente.	
Toragesic SL®	Cetorolaco	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada. Agitar por cerca de 5 minutos. Administrar imediatamente.	***
Tramal®	Tramadol	Cápsula	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada. Administrar imediatamente.	***
Transamin®	Ácido tranexâmico	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 20-50 ml de água destilada. Administrar imediatamente.	***
Trayenta®	Linagliptina	Comprimido revestido		X	O medicamento não deve ser triturado devido à falta de estudos que comprovem a segurança e eficácia.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Trileptal®	Oxacarbazepina	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água destilada. Administrar imediatamente.	Solução Oral
Tylenol®	Paracetamol	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10 -20 ml de água destilada. Administrar imediatamente.	***
Tylenol®	Paracetamol	Solução Oral Gotas	X		Diluir a dose prescrita em 15ml de água filtrada.	***
Tylenol DC®	Paracetamol + Cafeína	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10mL de água destilada. Administrar imediatamente.	***
Tylex®	Paracetamol + codeína	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 20 ml de água destilada. Administrar imediatamente.	***

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Unoprost®	Doxazosina	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10mL de água destilada. Administrar imediatamente.	
Ursacol®	Tosilato sultamicilina	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente	***
Valtrex®	Cl. Valaciclovir	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água destilada. Administrar imediatamente.	***
Vastarel MR®	Trimetazidina	Comprimido revestido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Vancomicina	Vancomicina	Cápsula	X		Diluir o conteúdo da cápsula em 20ml de água filtra. Administrar imediatamente após dissolução do medicamento	***
Vfend®	Voriconazol	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água destilada. Administrar imediatamente.	***
Venalot®	Troxerrutina/Cumarina	Comprimido revestido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Vertex®	Flunarizina	Comprimido		X	Possui excipientes que podem obstruir a sonda quando macerados e solubilizados.	Solução Oral gotas.
Viagra®	Sildenafil	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 20ml de água mineral. Administrar imediatamente	***
Vibramicina	Cloridrato de doxicilina	Comprimido revestido	X		Dissolver em 50mL de água antes da administração e administrar imediatamente.	***
Vimpat®	Lacosamida	Comprimido revestido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Forma farmacêutica EV ou Solução Oral

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Voltaren®	Diclofenaco sódico	Comprimido		X	Macerar causa perda do revestimento entérico, inativando o princípio ativo. Pode ocasionar obstrução da sonda	Forma farmacêutica IM
Vonau Flash®	Cloridrato de ondansetrona	Comprimido de desintegração oral		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Vytorin®	Sinvastatina + Ezetimiba	Comprimido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Xarelto®	Rivaroxabana	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente	***
Xifaxan®	Rifaximina	Comprimido revestido		X	Não há estudos que comprovem a eficácia e segurança.	Discutir alternativa terapêutica com o prescritor.
Zentel®	Albendazol	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 20-30ml de água destilada. Administrar imediatamente	Utilizar suspensão oral
Zentel®	Albendazol	Suspensão	X		Diluir em 15ml de água filtrada.	***
Zetia®	Ezetimiba	Comprimido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente	***
Zinnat®	Axetil-Cefuroxima	Comprimido revestido		X	Macerar causa perda do revestimento entérico, inativando o princípio ativo. Pode ocasionar obstrução da sonda.	Suspensão Oral
Zinnat®	Axetil-Cefuroxima	Suspensão oral	X		Diluir 10mL do medicamento em 20mL de água.	***
Zitromax®	Azitromicina	Comprimido revestido		X	Macerar o comprimido leva a perda do revestimento e pode obstruir a sonda.	Suspensão Oral
Zoloft®	Sertralina	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água destilada. Administrar imediatamente.	***

Apresentação comercial	Princípio ativo	Forma Farmacêutica	Pode ser administrado via Sonda?		Recomendação	Alternativa de substituição
			SIM	NÃO		
Zoltec®	Fluconazol	Cápsula	X		Diluir o conteúdo da cápsula em 20ml de água mineral. Administrar imediatamente após dissolução do medicamento	***
Zovirax®	Aciclovir	Comprimido	X		Dispersar em no mínimo 50mL de água.	Forma farmacêutica endovenosa
Zyloric®	Alopurinol	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 20mL de água destilada. Administrar imediatamente.	***
Zyvox®	Linezolida	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 20mL de água destilada. Administrar imediatamente.	***
Zyprexa®	Olanzapina	Comprimido revestido	X		Triturar e diluir o medicamento em 20ml de água mineral. Administrar imediatamente	***

Referencia Bibliográfica:

- Buxton ILO. Farmacocinética e Farmacodinâmica: a dinâmica da 304:323 distribuição, ação e eliminação dos fármacos. In: Goodman & Gilman. As Bases farmacológicas da terapêutica. 11a. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill Interamericana do Brasil; 2006. p. 1-36.
- Parfitt K. Martindale: the complete drug reference. 32 th. London: Pharmaceutical Press; 2009.
- Bradnam V; White, R. Handbook of drug administrativo via enteral feeding tubes On behalf of the British Pharmaceutical Nutrition Group. Pharmaceceutical Press. Chicago; 2010.
- LACY, C.F., ARMSTRONG, L.L, GOLDMAN, M. P. Medicamentos LexiComp Manole. 1ª edição Brasileira. Lexi-Comp.
- NATIONAL PATIENT SAFETY GOAL-IDENTIFY. Anually review a list of lookalike/sound-alike drugs used in the organization, and Take action to prevent errors involving the interchange of these drugs. 2006-2007
- WHITE, R. BRADNAM V. Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes. Second Edition, London: Pharmaceutical Press, 2011
- HANDBOOK of drug administration via enteral feeding tubes. 3. ed. [s. l.]: Pharmaceutical Press, 2015. 753 p. Disponível em: <https://rudiapt.files.wordpress.com/2017/11/handbook-of-drug-administration-via-enteral-feeding-tubes-2015.pdf>. Acesso em: 7 out. 2021.
- MANUAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR ACESSOS ENTERAIS. [s. l.: s. n.], 2013. 44 p. Disponível em: <https://guiafarmacutico.hsl.org.br/apoio-a-prescricao/PublishingImages/administracao-de-medicamentos/administracao-via-sonda/Manual>.
- ASSISTÊNCIA farmacêutica na administração de medicamentos via sonda: escolha da forma farmacêutica adequada. Assistência farmacêutica na administração de medicamentos via sonda: escolha da forma farmacêutica adequada, [s. l.], p. 10, 11 dez. 2008. Disponível em: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57123147/Administracao_med_sne_-_Einstein-with-cover-page-v2.pdf