Técnica para Antissepsia Cirúrgica das Mãos com Produto à Base de Álcool

- Após vestir a roupa privativa, o gorro e máscara: ao chegar ao centro cirúrgico, lave as mãos com sabonete líquido e água.
- Para o preparo cirúrgico das mãos com produto à base de álcool (PBA), siga cuidadosamente o passo a passo a seguir. (Antes de cada procedimento cirúrgico).
- Após a cirurgia: ao retirar as luvas, se houver resíduos ou talco, lavar com água e sabão.
  Atenção!!!
  A cada 3 horas de cirurgia: repetir o processo.



Coloque aproximadamente 5 ml (3 doses) de PBA na palma da sua mão esquerda.



Mergulhe as pontas dos dedos da mão direita no produto, friccionando-as para descontaminar embaixo das unhas (5 segundos).











Imagens 3-7: **Espalhe o produto no antebraço direito até o cotovelo. Assegure-se de que todas as superfícies sejam cobertas pelo produto. Utilize movimentos circulares no antebraço até que o produto evapore completamente (10-15 segundos).**











Imagens 8-10: **Agora, repita os passos 1 a 7 para a mão e antebraço esquerdo.**

Coloque aproximadamente 5ml (3 doses) do PBA na palma da mão esquerda como ilustrado, e esfregue ambas as mãos ao mesmo tempo até o punho, seguindo todos passos nas imagens 12 a 17 (20-30 segundos).

Cubra com PBA todas as superfícies das mãos até o punho, friccionando palma contra palma, em movimentos rotativos.



Friccione o produto no dorso da mão esquerda, incluindo o punho, movimentando a palma da mão direita no dorso esquerdo com movimentos de vai e vem e vice-versa.



Friccione uma palma contra a outra com os dedos entrelaçados.



Friccione o dorso dos dedos mantendo-os dentro da palma da outra mão, em movimentos de vai e vem.



Friccione o polegar da mão esquerda com movimentos de rotação da palma da mão direita enlaçada e vice-versa.



Quando as mãos estiverem secas, o avental cirúrgico/ capote poderá ser vestido e as luvas cirúrgicas estéreis poderão ser calçadas.

Este procedimento deve ser realizado por no mínimo 2 minutos.

VILA NOVA STAR
REDE D'OR